

주치의에게 VASCEPA®에 대한 정보를 얻으세요.

Pure EPA
Vascepa[®]
(icosapent ethyl)

당신은 매우 높은 수치의 트라이글리세라이드를 낮추기 위해 많은 노력을 하고 계십니다. 하지만, 그 수치는 여전히 너무 높을 수 있습니다. 다음은 VASCEPA가 당신에게 적합한지 알아보기 위해 주치의와 상의하실 수 있는 몇 가지 질문입니다.

- 1. 매우 높은 수치의 트라이글리세라이드는 무엇을 의미하나요?
- 2. 매우 높은 수치의 트라이글리세라이드를 치료하는 것이 왜 중요하며 내 수치는 얼마인가요?
- 3. 매우 높은 수치의 트라이글리세라이드 치료는 높은 콜레스테롤 치료와 어떻게 다른가요?
- 4. VASCEPA는 무엇이며 나를 도울 수 있나요?
- 5. VASCEPA가 FDA 승인을 받았고 처방전이 있어야만 복용할 수 있다는 사실이 왜 중요하나요?
- 6. 얼마나 자주 VASCEPA를 복용해야 하나요?
- 7. VASCEPA의 잠재적인 부작용은 무엇인가요?
- 8. 치료를 하는 경우 얼마나 빨리 트라이글리세라이드 수치를 확인할 수 있나요?

기타 참고 사항: _____

분명합니다. VASCEPA는 하나밖에 없습니다.

순수 EPA Omega-3만을 함유합니다.*
FDA의 승인을 받음.

식단을 병용한 VASCEPA는 LDL-C를 높이지 않고 성인의 매우 높은 트라이글리세라이드를

↓ 33%

낮추는 것으로 임상적으로 입증되었습니다.†



VASCEPA를 매일 4그램 복용하는 것이 왜 중요합니까?

VASCEPA의 모든 효능을 얻기 위해서는 주치의의 처방대로 FDA 승인을 받은 4그램을 매일 복용하는 것이 중요합니다. 환자가 건강한 식단과 함께 VASCEPA를 매일 4그램 복용하는 경우 악성 콜레스테롤 수치를 높이지 않고 매우 높은 수치의 트라이글리세라이드를 33%나 낮추는 것으로 임상 시험을 통해 입증되었습니다.† 이 권장 복용량 미만을 복용하면 이러한 결과를 얻을 수 없습니다.‡



표준 사이즈의 경우, 음식과 함께 1일 2회 1그램 캡슐 두 알 복용.



작은 사이즈를 원하는 경우, 음식과 함께 1일 2회 0.5그램 캡슐 4알 복용.

*Vascepa 1그램 캡슐은 EPA로 알려진 유일한 Omega-3 지방산과 비활성 성분으로 구성된 아이코사펜트 에틸 1그램을 함유합니다.

† 매우 높은 수치의 트라이글리세라이드 수치를 가진 성인을 대상으로 식단 변화와 함께 수행된 MARINE 임상 연구에 의하면 위약과 비교하여 LDL-C 상승 없이 33% 감소 효과가 나타났습니다. 개인별 결과는 다를 수 있습니다.

‡ Bays HE, Ballantyne CM, Kastelein JJ, Isaacsohn JL, Braeckman RA, Soni PN. 매우 높은 수치의 트라이글리세라이드 환자의 아이코사펜트 에틸 에스터(AMR101) 치료(다기관, 위약-대조, 무작위 배정, 이중 맹검, 개방 표지 확대(MARINE) 시험 12주 연구) Am J Cardiol. 2011;108:682-90.

지금 절약하세요

이 VASCEPA 절약 카드는 사용할 수 있는 활성화된 카드입니다. VASCEPA 처방전과 함께 약사에게 제시하여 지금부터 비용 절감을 시작하세요.

VASCEPA는 제약 없이 대부분의 환자에게 보험이 적용됩니다.

상용 보험에 가입되어 있는 환자는 90일치 복용량에 대해 최소 \$9를 지불합니다.*

가입 자격 여부에 따름. 제한 사항이 적용됨.

Pay as little as \$9
for 90 days.*



Expiration Date: 12/31/2019
*Limitations apply. See reverse side for details.
Reimbursement limited to \$80 per month or \$240 on a 90 day fill.

Powered by:
CHANGE HEALTHCARE
BIN# 004682
PCN# CN
GRP# ECVASCEPA
ID# 59021139303

Pure EPA
Vascepa
(icosapent ethyl)

Pharmacist and Beneficiary: When you use this card, you are certifying that you have not submitted and will not submit a claim for reimbursement under any Federal, State, or other Governmental programs for this prescription.

* Medicare, Medicaid, Medicare Advantage, Medicare Part D, Tricare 및 VA 등, 연방 정부 또는 주 정부 보건료 프로그램에서 비용의 일부가 지불되는 처방약의 구입에는 적용되지 않습니다. 버몬트주 거주자, 버몬트주 면허를 소지한 전문 의료인, 18세 미만 환자, 또는 법 또는 환자 보험에서 금지하거나 과세 또는 제한이 부과되는 지역에는 적용되지 않습니다. 최대 한 달 기준 \$80 또는 90일치 기준 \$240 절약. 건강보험 거래소 또는 현금 지급을 통한 상업 보험에 가입한 자를 포함한 자격 있는 환자. 2019년 12월 31일까지 유효한 프로모션.

적응증

VASCEPA란?

VASCEPA는 저지방 및 저콜레스테롤 식단과 함께 사용되어 성인의 트라이글리세라이드(지방)의 높은 수치를 낮춰주는 처방약입니다.

- VASCEPA가 췌장의 염증(췌장염) 발병 위험에 변화를 주는지는 실증되지 않았습니다.
- VASCEPA의 심장마비 또는 뇌졸중 예방 효과는 실증되지 않았습니다.
- 어린이의 경우 VASCEPA가 안전하고 효과가 있는지 실증되지 않았습니다.

중요한 안전 정보

VASCEPA를 복용하면 안 되는 환자

- 아이코사펜트 에틸 또는 VASCEPA 함유 성분에 알레르기가 있는 경우 VASCEPA를 복용하면 안 됩니다.

VASCEPA의 잠재적인 부작용은?

- 생선 또는 조개류에 알레르기가 있는 사람이 VASCEPA에도 알레르기가 있는지는 실증되지 않았습니다.
- 간 문제가 있는 환자가 VASCEPA를 복용하는 경우 주치의는 치료 중 혈액 검사를 해야 합니다.
- VASCEPA의 가장 흔한 부작용은 관절통입니다. 부작용에 관한 의학적 정보는 주치사와 상의하십시오.

모든 의약품이 그렇듯이, VASCEPA 역시 복용 시 심각한 부작용의 가능성이 있습니다.

부작용이 있을 경우 1-855-VASCEPA번으로 전화주시거나 1-800-FDA-1088번을 통해 FDA(미국 식품 의약국)에 전화하실 수 있습니다.

혈액 응고에 영향을 미치는 약물(항응혈제 또는 혈액 희석제)을 복용하는 경우 주치의에게 알려야 합니다.

VASCEPA 캡슐 전체를 복용하십시오. 삼키기 전에 VASCEPA 캡슐을 깨거나 부수거나 녹이거나 씹지 마십시오.

VASCEPA에 대한 자세한 정보는, Vascepa.com에서 전체 환자 정보를 참조하거나 1-855-VASCEPA(1-855-827-2372)에 전화로 문의하세요.



지적 재산권은 Amarin 기업의 소유입니다.

© 2018 Amarin Pharma, Inc. Bedminster, NJ, USA. 모든 권리 보유.
VAS-01076 07/18

